

BUSOL

0,004 mg/ml

PRÁVĚ VČAS

**BUSERELIN – injekční roztok
pro skot, koně a králíky.**



BUSOL 0,004 mg/ml – injekční roztok pro skot.

Léčivá látka: Buserelinum (jako buserelini acetat)
0,004 mg/ml. Čirá bezbarvá kapalina.

Cílový druh zvířat: Skot, koně, králíci.

Indikace: Krávy: Indukce ovulace u krav s dominantním folikulem. Synchronizace říje a indukce ovulace. Léčba ovariálních folikulárních cyst.

Klisny: Indukce ovulace u klisen v říji. Zvýšení pravděpodobnosti zabřeznutí.

Ramlíce: Indukce ovulace při inseminaci post partum.

Dávkování: Intramuskulární (skot, koně, králíci), intravenózní (koně) nebo subkutánní (koně, králíci) podání.

Krávy: Indukce ovulace u krav s dominantním folikulem (2,5 ml Busolu), synchronizace říje a indukce ovulace při

následujícím používání: podání buserelinu (den 0), následované ošetřením PGF2A za sedm dní (den 7) a druhé podání buserelinu po devíti dnech (den 9) (2,5 ml Busolu). Léčba ovariálních folikulárních cyst (5 ml Busolu).

Klisny: Indukce ovulace u klisen v říji při podávání opakovaně v 12hodinových intervalech (5–10 ml). Zvýšení pravděpodobnosti zabřeznutí při podání v rozmezí 8 až 12 dnů po přirozeném páření / inseminaci (5–10 ml Busolu).

Králíci: Indukce ovulace při inseminaci post partum (0,2 ml Busolu). Zvýšení pravděpodobnosti zabřeznutí (0,2 ml Busolu).

Ochranné lhůty: Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti: Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 28 dní.

Reg. číslo: 96/051/17-C.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenic.cz

www.bubenic.cz