



**LIVISTO**



**MEDESON<sup>®</sup>**

Medetomidini hydrochloridum 1 mg/ml

**ZARUČEN KLIDNÝ PRŮBĚH**

Sedace a premedikace k celkové anestezii  
pro psy a kočky

**Spolu s vámi**

# MEDESON<sup>®</sup>

Medetomidini hydrochloridum 1 mg/ml

## Pro psy a kočky:

- Sedace s cílem usnadnit znehybnění zvířat v průběhu zákroků.
- Premedikace před celkovou anestezií.

## Dávkování pro psy

Hmotnost (kg)	Sedace	Sedace	Premedikace
	intravenózně (i.v.) (ml)	intramuskulárně (i.m.) (ml)	
1	0,08	0,10	0,01-0,04
2	0,12	0,16	0,02-0,08
3	0,16	0,21	0,03-0,12
4	0,19	0,25	0,04-0,16
5	0,22	0,30	0,05-0,20
6	0,25	0,33	0,06-0,24
7	0,28	0,37	0,07-0,28
8	0,30	0,40	0,08-0,32
9	0,33	0,44	0,09-0,36
10	0,35	0,47	0,10-0,40
12	0,40	0,53	0,12-0,48
14	0,44	0,59	0,14-0,56
16	0,48	0,64	0,16-0,64
18	0,52	0,69	0,18-0,72
20	0,56	0,74	0,20-0,80
25	0,65	0,86	0,25-1,00
30	0,73	0,98	0,30-1,20
35	0,81	1,08	0,35-1,40
40	0,89	1,18	0,40-1,60
50	1,03	1,37	0,50-2,00
60	1,16	1,55	0,60-2,40

## Dávkování pro kočky

Hmotnost (kg)	Mírná sedace	Hluboká sedace
	intramuskulárně (i.m.) (ml)	
1	0,05-0,10	0,10-0,15
2	0,10-0,20	0,20-0,30
3	0,15-0,30	0,30-0,45
4	0,20-0,40	0,40-0,60
5	0,25-0,50	0,50-0,75
6	0,30-0,60	0,60-0,90
7	0,35-0,70	0,70-1,05
8	0,40-0,80	0,80-1,20
9	0,45-0,90	0,90-1,35
10	0,50-1,00	1,00-1,50

**Medeson obsahuje účinnou látku medetomidini hydrochloridum 1 mg/ml, sedativní agens, mající analgetické a myorelaxační účinky.**

- Pro psy a kočky, poukazující na bioekvivallenci s originálním přípravkem.
- Rychlý nástup účinku. Maximální efekt je dosažen během 15–20 minut. Klinický efekt je závislý na dávce, trvající 30–180 minut.
- Jednoduchá aplikace psům a kočkám. Psi: i.m. nebo i.v. Kočky: i.m., i.v. nebo s.c.
- Balení: lahvička o obsahu 10 ml.

**Medeson 1 mg/ml** injekční roztok pro psy a kočky. 1 ml obsahuje **1 mg** Medetomidini hydrochloridum.

**Cílový druh zvířat:** Psi a kočky.

**Indikace:** Sedace a premedikace k celkové anestezií.

**Způsob podání:** **Kočky:** i.m., i.v., s.c., **psi:** i.v., i.m.

**Dávkování: Psi:** K navození **sedativního účinku** je třeba aplikovat 10–80 µg medetomidin-hydrochloridu/kg ž.hm. Maximální účinek se dostaví během 15–20 minut. Klinický účinek závisí na dávce a trvá 30 až 180 minut. K **premedikaci** je třeba aplikovat 10–40 µg medetomidin-hydrochloridu/kg ž.hm.tj. 0,1–0,4 ml přípravku/10 kg ž.hm. **Kočky:** K navození **sedativního účinku** je třeba aplikovat 50–150 µg medetomidin-hydrochloridu/kg ž.hm, tj. 0,05–0,15 ml přípravku/kg ž.hm. K **premedikaci** je třeba aplikovat 80 µg medetomidin-hydrochloridu/1 kg ž.hm., tj. 0,08 ml přípravku/1 kg ž.hm.

**Ochranné lhůty:** Nemí určeno pro potravinová zvířata.

**Doba použitelnosti:** 3 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

**Uchování:** Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**Balení:** 10 ml.



**Dr. Bubeniček**

Dr. Bubeniček, spol. s r. o.  
Šimáčkova 104, 628 00 Brno  
tel/fax: +420 544 231 413  
mobil: +420 602 586 622  
+420 737 118 749  
e-mail: info@bubenicke.cz