



DEXAFAST

2 mg/ml

RYCHLOST A SÍLA



Dexafast 2 mg/ml injekční roztok pro koně, skot, prasata, psy a kočky
SILNÉ PROTIZÁNĚTLIVÉ ÚČINKY

Dexamethasonum 2 mg/ml. Indikace: Léčba zánětlivých nebo alergických stavů. Skot: K vyvolání porodu a léčbě primární ketózy (acetonémie). Koně: K léčbě artritidy, burzitidy nebo tenosynovitidy. Cílové druhy zvířat: Koně, skot, prasata, psi a kočky. Nežádoucí účinky: Viz příbalová informace. Dávkování: Cesty podání: Koně: Intravenózní, intramuskulární nebo intraartikulární podání. Skot, prasata, psi a kočky: Intramuskulární podání. Léčba zánětlivých nebo alergických stavů: Koně, skot, prasata: 0,06 mg dexamethasonu/kg ž. hm., což odpovídá 1,5 ml/50 kg. Psi, kočky: 0,1 mg dexamethasonu/kg ž. hm., což odpovídá 0,5 ml/10 kg. Léčba primární ketózy u skotu (acetonémie): Doporučuje se 0,02 až 0,04 mg dexamethasonu/kg ž. hm. odpovídající dávce 5–10 ml přípravku na 500 kg ž. hm. podané intramuskulárně v závislosti na velikosti krávy a délce trvání příznaků. Vyvolání porodu – k zamezení nadměrné velikosti plodu a otoku mléčné žlázy u skotu: Jednorázové intramuskulární podání 0,04 mg dexamethasonu/kg ž. hm., což odpovídá 10 ml přípravku na 500 kg ž. hm. po 260. dni březosti. K porodu obvykle dojde během 48–72 hodin. Léčba artritidy, burzitidy nebo tenosynovitidy intraartikulárním podáním u koní: Dávkujte 1–5 ml přípravku. Ochranné lhůty: Skot: maso: 8 dní. Mléko 72 hodin. Prasata: maso: 2 dny. Koně: maso: 8 dní. Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Balení: 100 ml. Registrační číslo: 96/028/23-3. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz