

Hymatil 300mg/ml

Injekční roztok pro skot a ovce

Odkopněte pneumonii

Zbavte se pneumonie
jednou injekcí



Dr. Bubeniček




invesa

Hymatil 300mg/ml

Bovinní respirační syndrom

Bovinní respirační syndrom (BRS) je hlavním klinickým a ekonomickým problémem v chovu telat:

- u nevakcinovaných telat
- po dlouhém transportu
- při míchání zvířat z různých farem



Bakterie jsou patologické látky, které způsobují mortalitu.

Symptomy	Ekonomické důsledky
dušnost, kašel, rýma, deprese, anorexie a vysoké teploty	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Průměrný denní přírůstek *(ADG) ↓ Konverze potravy *(FCE) ↑ Úmrtnost ↑ Veterinární výdaje ↑ Pracovní síla

*Průměrný denní přírůstek (Average Daily Gain – ADG)
*Konverze potravy (Feed Conversion Efficiency – FCE)

Ve stádu hrozí propuknutí BRS když:

- jsou telata při příjezdu zubožená,
- už při příjezdu 15 a více procent trpí BRS,
- když během jakéhokoli 24hodinového časového úseku vykazuje více než 1 z 5 telat problémy s dýcháním,
- když, po dobu tří dnů, 5 a více procent telat vykazuje problémy s dýcháním.

V porovnání s jinými antibiotiky používanými k léčbě BRS, Tilmikosin zajišťuje:

Vyšší účinnost a nižší potřebu opakované léčby.

Nižší úmrtnost způsobenou BRS při příjezdu telat na farmu.

Vyšší hmotnost a průměrný denní přírůstek, lepší konverzi potravy.

Účinnější léčbu (vyžaduje méně dávek léku).

Dávkování
Ovce a skot
1 ml/ 30 kg váhy
Pouze subkutánně

Odkopněte pneumonii

Zbavte se pneumonie jednou injekcí



invesa


Hymatil

Injekční roztok 30% tilmikosinu (300 mg/ml).

Tilmikosin obsahuje široké antibakteriální spektrum. V souvislosti s dýchací soustavou telat účinkuje hlavně proti G⁺ bakteriím, některým G⁻ bakteriím (*Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni* a mycoplasma).

Výhody	Přínosy
Dlouho účinkující léčba.	Ulehčuje práci veterináři a zmírňuje stres zvířat.
Rychlé působení.	Ulehčuje práci veterináři a zmírňuje stres zvířat.
Lék se hromadí v makrofázích a neutrofilech.	Účinkuje v infekčním ložisku.
Vyvolání apoptózy neutrofilů. Jiná antibiotika tento efekt ve stejných podmínkách nevyvolají (např. penicilin, ceftiofur, oxytetracyklin).	Přispívá k odstranění zánětu během zápalu plic.

Tilmikosin přispívá k odstranění zánětu během zápalu plic vyvoláním apoptózy neutrofilů.



Hymatil 300mg/ml

Injekční roztok pro skot a ovce

Odkopněte pneumonii

Zbavte se pneumonie jednou injekcí

Složení: Tilmikosin 300 mg/1 ml.

Indikace: Skot – k léčbě pneumonie způsobené *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* a dalšími organismy citlivými na tilmikosin.

Ovce – léčba infekcí respiračního traktu způsobených bakteriemi *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*. Léčba interdigitální nekrobacilózy ovcí způsobené bakteriemi *Dichelobacter nodosus* a *Fusobacterium necrophorum*. Léčba akutní mastitidy ovcí způsobené bakteriemi *Staphylococcus aureus* a *Mycoplasma agalactiae*.

Dávkování a způsob podání: Podávejte v jediné subkutánní injekci s dávkováním 10 mg/kg ž. hm. Nasajte požadovanou dávku z lahvičky a vyjměte stříkačku z jehly. Má-li být ošetřena skupina zvířat, ponechejte jehlu v lahvičce jako odběrovou jehlu pro následující dávky. Zabezpečte zvíře a zaveďte mu samostatnou jehlu subkutánně v místě injekce. Doporučuje se injekce do kožní řasy nad hrudním košem za ramenem. Zasuňte do jehly stříkačku a obsah vstříkněte do spodiny kožní řasy. Nevstříkujte do jednoho injekčního místa více než 20 ml.

Ochranné lhůty: Skot: Maso – 70 dní. Mléko – 36 dní. Ovce: Maso – 42 dní. Mléko – 18 dní.

Doba použitelnosti: 2 roky.

Balení: 50ml, 100 ml a 250 ml.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel./fax: +420 544 231 413
mobil: +420 737 118 749
+420 602 586 622
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz