

# Máte problémy s mastitídou?



## Procopen Injektor 3g (Prokain benzylpenicilin)

**Procopen Injektor 3g** intramamární suspenze – speciálně vyvinutá formule určená k léčbě zánětu mléčné žlázy skotu způsobené bakteriemi senzitivními na benzylpenicilin.

Jedná se především o stafylokoky a streptokoky izolované z mléčné žlázy.

Přednosti:

- › pohodlná a efektivní léčba streptokokové a stafylokokové infekce mléčné žlázy
- › vysoká dávka benzylpenicilinu (3 000 000 IU)
- › dosažení optimální koncentrace aktivní substance v mléčné žláze
- › velmi dobrá tkáňová penetrace s prolongovanou aktivitou
- › optimální délka kanyly injektoru s úpravou hrotu k předcházení rizika poškození citlivé tkáně jednotlivých čtvrtí mléčné žlázy


# ... vaše volba pro léčbu mastitídy



[ 1 ] Hygiena mléčné žlázy je velmi důležitá. Všechny čtvrtě mléčné žlázy je třeba bezprostředně před aplikací pečlivě vydojit.



[ 2 ] Pro očištění báze struku od zbytků podestýlky a nečistot je vhodné použít bavlněný polštářek impregnovaný alkoholickým roztokem.



[ 3 ] Přidržíte injektor rukou tak, abyste měli možnost krouživým pohybem odstranit zátku injektoru a přitom nekontaminovali kanylu injektoru.



[ 4 ] Aplikujte celý obsah přípravku do strukového kanálu **každých 24 hodin po dobu 3 po sobě následujících dnů**. Následnou masáží čtvrti dosáhnete dokonalé penetrace obsahu injektoru do mléčné žlázy.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.  
Šimáčkova 104, 628 00 Brno  
tel./fax: +420 544 231 413  
mobil: +420 737 118 749  
+420 602 586 622  
e-mail: info@bubenicek.cz

[www.bubenicek.cz](http://www.bubenicek.cz)

## Procopen injektor 3 g intramamární suspenze pro skot.

**Složení:** Každý injektor o objemu 10 ml obsahuje bílou až žlutavou suspenzi: prokain-benzylpenicilin 1 H<sub>2</sub>O 3,0 g. **Indikace:** Léčení infekce mléčné žlázy krav v laktaci způsobených stafylokoky a streptokoky citlivými na benzylpenicilin. **Dávkování a způsob podání:** Intramamární podání: 3,0 g prokain-benzylpenicilinu na jednu postiženou čtvrt vemene (= 3 000 000 IU penicilinu), což odpovídá: 1 Procopen injektor na postiženou čtvrt vemene jednou za 24 hodin po dobu 3 dnů. **Ochranné lhůty:** Maso a vnitřnosti: 5 dnů. Mléko: 6 dnů. **Doba použitelnosti:** 3 roky. **Balení:** Lepenková krabice obsahující 24 bílých intramamárních injektorů po 10 ml.