

EFICUR[®]

Ceftiofur hydrochlorid, injekční suspenze

k okamžitému použití



Dr. Bubeniček



ZÁKLADY ÚSPĚCHU




ŠIROKÁ NABÍDKA BALENÍ! Přizpůsobeno všem potřebám zákazníků

- 50 ml lahvička
- 100 ml lahvička
- 250 ml lahvička + ochranný kryt
 - Šetří čas při používání přípravku
 - Zabraňuje poškození
 - Nižší cena za dávku

ÚČINNOST PŘÍPRAVKU!

- **VÝNIKAJÍCÍ INJEKTABILITA!**
snadno se aplikuje i při nízkých teplotách




Průměrný čas vypuzení obsahu

EFICUR® 50,3 s


PŘÍPRAVEK A 87,0 s

PŘÍPRAVEK B 82,5 s



- RYCHLÁ A SNADNÁ APLIKACE
- MŮŽETE OŠETŘIT VÍCE ZVÍŘAT ZA KRATŠÍ DOBU
- SNIŽUJE RIZIKO ZÁTĚŽE

• IDEÁLNÍ RESUSPENDACE



- NIŽŠÍ A POMALEJŠÍ SEDIMENTACE
- LEPŠÍ RESUSPENDACE
- PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ



EFICUR®

Ceftiofur hydrochlorid, injekční suspenze

■ ■ ■ Přizpůsobeno všem ■ ■ ■ potřebám zákazníků

- 50 ml lahvička
- 100 ml lahvička
- 250 ml lahvička + ochranný kryt
 - Šetří čas při používání přípravku
 - Zabraňuje poškození
 - Nižší cena za dávku



Dr. Bubeníček



EFICUR® 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot. **SLOŽENÍ:** Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg/ml. **INDIKACE:** Infekce vyvolané bakteriemi citlivými k ceftiofuru: Prasata – léčba respiračního onemocnění vyvolaného *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* a *Streptococcus suis*. Skot – léčba respiračního onemocnění vyvolaného *Mannheimia haemolytica* (dříve pod názvem *Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* a *Haemophilus somnus*. Léčba akutní interdigitální necrobacilózy (panaritium, putrefakce paznehtu), vyvolané *Fusobacterium necrophorum* a *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*). Léčba bakteriálního komponentu akutní poporodní (puerperální) metritidy vyvolané *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* a *Fusobacterium necrophorum* do 10 dnů po otelení. **CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT:** Prasata a skot. **DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH A ZPŮSOB PODÁNÍ:** Prasata – 3 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů, tj. 1 ml na 16 kg ž.hm., intramuskulárně. Skot – léčba respiračního onemocnění: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 až 5 dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, subkutánně. Léčba akutní interdigitální necrobacilózy: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm./den, subkutánně. Léčba akutní poporodní metritidy v období 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 5 následujících dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, subkutánně. Další podání musí být aplikováno na rozdílná místa. V případě akutní poporodní metritidy je v některých případech nutno nasadit další podpůrnou léčbu. **OCHRANNÁ LHŮTA:** Mléko – bez ochranných lhůt. Maso prasat – 5 dnů, Maso skotu – 8 dnů. **BALENÍ:** 50 ml, 100 ml, 250 ml s ochranným protektorem.

Laboratorios Hipra, S.A.
Avd. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
Spain

Tel.: (34) 972 43 06 60
Fax: (34) 972 43 06 61
hipra@hipra.com
www.hipra.com